
テタルティ摘出

▶使用器具　　▶評価ポイント ○

ギルスの後遺症で発生した異物を取り除く術式。まず血だまりを吸引し、ガイドラインに沿ってメスで患部を切り開く。つぎに血だまりを吸引して異物をピンセットで引き抜き、回収トレイに乗せよう。異物をほぼ垂直(88～92度)で抜けば「Cool」、垂直に近い角度(85～87　93～95度)なら「Good」、角度が悪いと「Miss」になり、評価は必ず「Bad」になる。異物回収後は、患部の血だまりを吸引し、人工膜を切除痕に乗せてヒールゼリーで定着させれば処置完了だ。



銃弾摘出と同じ処置法で進めつつ、ときおり発生する中毒症も沈静化させながら手術を進めよう。

【手　順】

1	ドレーン	血だまりを吸い取る
2	メス	ガイドラインに沿って患部を切り開く
3	ドレーン	血だまりを吸い取る
4	ピンセット	テタルティを引き抜き、トレイへ運ぶ
5	ピンセット	人工膜を切除痕に乗せる
6	ヒールゼリー	人工膜を定着させる


評価ポイントに関わる要素

- 血だまりが再発するまえに処置を終える
- 正しい角度でテタルティを引き抜く
- 引き抜いたテタルティを落とさずにトレイへ運ぶ
- ミスなく人工膜を患部に乗せる

電子ロック・カバー

▶使用器具　　▶評価ポイント ○

電子ロックのフタを取り除く処置。フタの表面に表示されているガイドラインの点をメスでなぞればフタが開く。ガイドラインが黄色の場合は、ヒールゼリーをガイドラインに塗って緑色に変えておく必要がある。



フタに表示されているすべての点をメスでなぞればフタが外れる。視界が悪いため、数回に分けてメスを入れよう。

【手　順】

1	ヒールゼリー※	ガイドラインを緑色に変える
2	メス	ガイドラインを切り取る

※フタが錆びついているときのみ使用

評価ポイントに関わる要素

- 黄色のガイドラインをすべて青色にしてから切開する

電子ロック・プラグ

▶使用器具　　▶評価ポイント ○

電子ロックの開錠を行なう処置。配置されているプラグをピンセットでつまみ、装置から引き抜いて回収トレイに乗せれば完了。ただし、一定間隔でプラグが順々に点灯する仕組みで、赤く光っているプラグに触ると処置失敗となり、ゲームオーバーだ。また、プラグの長さは3タイプあり、引き抜く距離が変わる。抜く角度による評価判定は、上記「テタルティ摘出」と同じなので参考にしてほしい。



長いプラグほど引き抜くのに時間がかかる。光が点灯する順番を確認し、長いプラグから引き抜いていこう。

【手　順】

1	ピンセット	プラグを引き抜き、トレイへ運ぶ

評価ポイントに関わる要素

- 正しい角度でプラグを引き抜く
- ミスなくプラグを引き抜き、回収トレイへ運ぶ

キリアキ

▶使用器具　　▶評価ポイント △

臓器内に潜み、裂傷を生み出すギルス。エコーで探知したあとにメスで露出させ、レーザー照射で消滅させよう。キリアキは直線的に動くので、動きを予想して露出させるといい。露出後はレーザーを2回照射すれば消滅する。露出時に発生した裂傷と切開口の処置も忘れずに行なおう。



まずはエコーでキリアキの影を表示。露出させるときは、メス選択後に影をタッチする感覚で行なうといい。



続けてレーザー照射するよりも、キリアキの上をタッチする要領で2回レーザーを当てると倒しやすい。

【手　順】

1	スキャナ	潜伏したキリアキの位置を特定する
2	メス	キリアキを露出させる
3	針と糸	キリアキ露出時に発生した傷を縫う
4	レーザー	キリアキにダメージを与える
5	ヒールゼリー	切開口に塗る

キリアキ・マザークラス

▶使用器具　　▶評価ポイント △

出現時に3つの裂傷を生み出すキリアキの上位ギルス。対処法はキリアキと同じだが、マザークラスは1回レーザーを当てると臓器内に潜伏してしまうため、消滅させるには手順を数回繰り返す必要がある。また、潜伏時にサナギを生むことがあり、サナギの処置も平行して進めよう。



キリアキ　マザークラスは出現時に3本の裂傷を生み出す　この傷がマザークラスが出現した合図だ。



キリアキ・マザークラスはレーザーを当てるたびに臓器内に潜伏するため、手順を繰り返して対処しよう。


【手　順】

1	スキャナ	キリアキ　マザークラスの位置を特定する
2	メス	キリアキ・マザークラスを露出させる
3	針と糸	キリアキ・マザークラス露出時に発生した傷を縫う
4	レーザー	キリアキ　マザークラスにダメージを与える
5		1～4を繰り返し、キリアキ・マザークラスを消滅させる
6	ヒールゼリー	切開口に塗る

サナギ

▶使用器具　　▶評価ポイント ―

キリアキ・マザークラスが生み出すサナギの摘出処置。臓器内に生成されたサナギをエコーで見つけ、メスで露出させる。その後、サナギを回収して切開口をヒールゼリーで治療すれば完了。サナギが羽化するとキリアキになる。



サナギはキリアキ　マザークラスを攻撃するまえに露出させて回収。キリアキに羽化させないようにしたい。

【手　順】

1	スキャナ	サナギの位置を特定する
2	メス	サナギを露出させる
3	ピンセット	サナギをトレイへ運ぶ
4	ヒールゼリー	切開口に塗る